

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/bayer-advantage-roztwor-do-nakrapiania-dla-kotow-4x0-8ml-p-145864.html>



## Bayer Advantage Roztwór Do Nakrapiania Dla Kotów 4x0,8ml

Cena	<b>102,17 zł</b>
Numer katalogowy	<b>5909997007571</b>
Kod producenta	<b>5909997007571</b>
Zastosowanie	<b>Owadobójcze</b>
Pojemność	<b>3, 2</b>
Specjalna potrzeba	<b>Alergia skórna</b>
Faza życia	<b>Wszystkie fazy życia</b>
Specjalna potrzeba(filtry)	<b>Skóra</b>

### Opis produktu

#### Bayer Advantage Roztwór Do Nakrapiania Dla Kotów 4x0,8ml - Opis Produktu

Zapobieganie i zwalczanie inwazji pcheł u kotów powyżej 8 tygodnia życia i o masie powyżej 4kg oraz jako element terapii alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

Advantage dla kotów to comiesięczna kompleksowa profilaktyka i leczenie pcheł dla kotów, które zabijają pchły poprzez kontakt, dzięki czemu nie muszą gryźć kota, aby umrzeć.

#### Bayer Advantage Roztwór Do Nakrapiania Dla Kotów 4x0,8ml - Dane Techniczne

- Skład: Imidaklopryd 100 mg/ml, Moksydektyn 10 mg/ml
- Pojemność: 4x0,8ml

#### Bayer Advantage Roztwór Do Nakrapiania Dla Kotów 4x0,8ml - Sposób Użycia

- Przed podaniem produktu należy dokładnie dobrać wielkość opakowania do masy ciała zwierzęcia
- Po otwarciu opakowania rozchylić włosy zwierzęcia u nasady głowy i lekko ściskając pojemnik zdeponować jego zawartość na skórze pacjenta
- Nie wcierać
- Po nakropieniu na skórę zwierzęcia produkt w krótkim czasie rozprzestrzenia się po jej powierzchni, działając w sposób kontaktowy
- Pozostaje w warstwie lipidowej powlekającej skórę i sierść działając przez okres do 4 tygodni
- Sporadyczne zmoczenie się zwierzęcia, np. w wyniku kąpieli lub rzęsigiego deszczu nie osłabia skuteczności produktu

#### Dodatkowe Informacje

##### Przeciwwskazania

Nie stosować u kotów poniżej 8 tygodnia życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

##### Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt do użytku zewnętrznego.

Nie należy dopuszczać, aby zwierzęta, którym ostatnio nanoszono produkt wzajemnie się wylizywały.

##### Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ustami.

Po zabiegu dokładnie umyć ręce.

Podczas zabiegu nie jeść, nie pić i nie palić.

---

W przypadku kontaktu produktu ze skórą osoby wykonującej zabieg, zmyć ją wodą i mydłem. Sporadycznie, podobnie jak przy podaniu innych produktów mogą wystąpić reakcje ze strony skóry (np. świąd, podrażnienie, alergia).

Przy dostaniu się do oka obficie wypłukać je wodą.

W razie utrzymującego się podrażnienia oraz po przypadkowym połknięciu udać się do lekarza i przedstawić ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Przechowywać z dala od żywności, napojów i pokarmu dla zwierząt.

Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia):

Z powodu gorzkiego smaku może pojawić się ślinienie u kotów, które lizały miejsce aplikacji bezpośrednio po jej wykonaniu.

Objaw ten nie oznacza zatrucia i ustępuje samoistnie po kilku - kilkunastu minutach.

W bardzo rzadkich przypadkach mogą pojawić się reakcje skórne takie jak wypadanie sierści, zaczerwienienie, świąd i uszkodzenia skóry.

Obserwowane było również pobudzenie, nadmierne ślinienie się i objawy neurologiczne takie jak zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenie mięśni i depresja.

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Badania laboratoryjne przeprowadzone u szczurów i królików nie wykazały działania teratogennego i embriotoksycznego.

Produkt może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.