

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/bayer-advantage-roztwor-do-nakrapiania-dla-kotow-4x0-8ml-p-145864.html>



Bayer Advantage Roztwór Do Nakrapiania Dla Kotów 4x0,8ml

Cena	101,96 zł
Numer katalogowy	5909997007571
Kod producenta	5909997007571
Pojemność	3, 2
Faza życia	Wszystkie fazy życia
Specjalna potrzeba	Alergia skórna
Zastosowanie	Owadobójcze
Specjalna potrzeba(filtry)	Skóra

Opis produktu

Bayer Advantage Roztwór Do Nakrapiania Dla Kotów 4x0,8ml - Opis Produktu

Zapobieganie i zwalczanie inwazji pcheł u kotów powyżej 8 tygodnia życia i o masie powyżej 4kg oraz jako element terapii alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

Advantage dla kotów to comiesięczna kompleksowa profilaktyka i leczenie pcheł dla kotów, które zabijają pchły poprzez kontakt, dzięki czemu nie muszą gryźć kota, aby umrzeć.

Bayer Advantage Roztwór Do Nakrapiania Dla Kotów 4x0,8ml - Dane Techniczne

- Skład: Imidaklopryd 100 mg/ml, Moksydektyn 10 mg/ml
- Pojemność: 4x0,8ml

Bayer Advantage Roztwór Do Nakrapiania Dla Kotów 4x0,8ml - Sposób Użycia

- Przed podaniem produktu należy dokładnie dobrać wielkość opakowania do masy ciała zwierzęcia
- Po otwarciu opakowania rozchylić włosy zwierzęcia u nasady głowy i lekko ściskając pojemnik zdeponować jego zawartość na skórze pacjenta
- Nie wcierać
- Po nakropieniu na skórę zwierzęcia produkt w krótkim czasie rozprzestrzenia się po jej powierzchni, działając w sposób kontaktowy
- Pozostaje w warstwie lipidowej powlekającej skórę i sierść działając przez okres do 4 tygodni
- Sporadyczne zmoczenie się zwierzęcia, np. w wyniku kąpieli lub rzęsigiego deszczu nie osłabia skuteczności produktu

Dodatkowe Informacje

Przeciwwskazania

Nie stosować u kotów poniżej 8 tygodnia życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Produkt do użytku zewnętrznego.

Nie należy dopuszczać, aby zwierzęta, którym ostatnio nanoszono produkt wzajemnie się wylizywały.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ustami.

Po zabiegu dokładnie umyć ręce.

Podczas zabiegu nie jeść, nie pić i nie palić.

W przypadku kontaktu produktu ze skórą osoby wykonującej zabieg, zmyć ją wodą i mydłem.
Sporadycznie, podobnie jak przy podaniu innych produktów mogą wystąpić reakcje ze strony skóry (np. świąd, podrażnienie, alergia).

Przy dostaniu się do oka obficie wypłukać je wodą.

W razie utrzymującego się podrażnienia oraz po przypadkowym połknięciu udać się do lekarza i przedstawić ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Przechowywać z dala od żywności, napojów i pokarmu dla zwierząt.

Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia):

Z powodu gorzkiego smaku może pojawić się ślinienie u kotów, które lizały miejsce aplikacji bezpośrednio po jej wykonaniu.

Objaw ten nie oznacza zatrucia i ustępuje samoistnie po kilku - kilkunastu minutach.

W bardzo rzadkich przypadkach mogą pojawić się reakcje skórne takie jak wypadanie sierści, zaczerwienienie, świąd i uszkodzenia skóry.

Obserwowane było również pobudzenie, nadmierne ślinienie się i objawy neurologiczne takie jak zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenie mięśni i depresja.

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Badania laboratoryjne przeprowadzone u szczurów i królików nie wykazały działania teratogenne i embriotoksycznego.

Produkt może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.