

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/bayer-advantix-krople-na-kleszcze-i-pchly-4x4ml-p-151835.html>



## Bayer Advantix Krople Na Kleszcze I Pchły 4x4ml

Cena	<b>104,62 zł</b>
Numer katalogowy	<b>5909997024158</b>
Kod producenta	<b>5909997024158</b>
Faza życia	<b>Wszystkie fazy życia</b>
Specjalna potrzeba(filtry)	<b>Skóra</b>
Wielkość pupila	<b>Rasy duże</b>
Zastosowanie	<b>Owadobójcze</b>
Pojemność	<b>16</b>
Specjalna potrzeba	<b>Alergia skórna</b>

### Opis produktu

#### Bayer Advantix Krople Na Kleszcze I Pchły 4x4ml - Opis Produktu

Bayer Advantix to preparat ochronny w kroplach dla psów powyżej 7 tygodnia życia i ras od 25 do 40kg, eliminujący kleszcze, pchły, wszy, wszczoły.

Jednorazowe zastosowanie zapobiega dalszej infestacji kleszczy i pcheł przez cztery tygodnie, przez co ogranicza się ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych.

Ponowna infestacja związana z pojawieniem się w otoczeniu zwierzęcia nowych pcheł może trwać przez sześć tygodni lub dłużej po rozpoczęciu leczenia.

Może być stosowany jako element terapii alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

#### Bayer Advantix Krople Na Kleszcze I Pchły 4x4ml - Dane Techniczne

- Pojemność: 4x4ml
- Skład: imidaklopid - 40mg, permetryna - 200mg

#### Bayer Advantix Krople Na Kleszcze I Pchły 4x4ml - Sposób Użycia

- Wyjmij pipetę z opakowania
- Trzymając pipetę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę
- Odwróć końcówkę i umieść drugim końcem na pipiecie. Przekręć końcówkę, aby przebić zamknięcie, po czym zdejmij końcówkę z pipety
- Zawartość pipety należy zakropić na skórę psa od łopatek do nasady ogona
- Zalecana minimalna dawka wynosi 10 mg/kg masy ciała imidaklopidu i 50 mg/kg masy ciała permetryny
- Wyłącznie do stosowania na skórę

#### Dodatkowe Informacje

Aby utrudnić pchłom bytowanie w środowisku, zaleca się stosowanie środków zwalczających dorosłe pchły i osobniki w stadiach rozwojowych w otoczeniu zwierzęcia.

Jednorazowe leczenie zapewnia widoczne działanie odstraszające wobec meszek i komarów w ciągu czterech tygodni, zmniejszając przez to ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych.

Preparat zachowuje skuteczność po zmoczeniu sierści zwierzęcia.

---

Jednakże w przypadku częstego kontaktu z wodą, konieczne może być ponowne naniesienie preparatu, w zależności od obecności ektopasożytów w otoczeniu zwierzęcia.

W takim przypadku nie należy stosować preparatu częściej, niż raz na tydzień.

W przypadku zaistnienia konieczności umycia psa szamponem, zaleca się uczynić to przed naniesieniem preparatu lub przynajmniej w tydzień po jego zastosowaniu, w celu uniknięcia konieczności powtarzania zabiegu.

**Działania niepożądane:**

W rzadkich przypadkach może wystąpić u psów przejściowa nadwrażliwość skóry (łącznie z objawami świądu i rumieniem w miejscu podania) i osowiałość.

**Ostrzeżenia specjalne:**

Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu zawartości pipety z oczami lub pyskiem psa, u którego stosuje się preparat. Należy dopilnować, aby produkt został podany we właściwy sposób, zgodnie z opisem w części (dawkowanie).