

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/bayer-advantix-krople-na-kleszcze-i-pchly-4x6ml-p-152215.html>



Bayer Advantix Krople Na Kleszcze I Pchły 4x6ml

Cena	141,43 zł
Numer katalogowy	4007221049616
Kod producenta	4007221049616
Zastosowanie	Owadobójcze
Pojemność	24
Specjalna potrzeba	Alergia skórna
Faza życia	Wszystkie fazy życia
Specjalna potrzeba(filtry)	Skóra

Opis produktu

Bayer Advantix Krople Na Kleszcze I Pchły 4x6ml - Opis Produktu

Bayer Advantix to preparat ochronny w kroplach dla psów powyżej 7 tygodnia życia i ras od 40 do 60kg, eliminujący kleszcze, pchły, wszy, wszolę.

Jednorazowe zastosowanie zapobiega dalszej infestacji kleszczy i pcheł przez cztery tygodnie, przez co ogranicza się ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych.

Ponowna infestacja związana z pojawieniem się w otoczeniu zwierzęcia nowych pcheł może trwać przez sześć tygodni lub dłużej po rozpoczęciu leczenia.

Może być stosowany jako element terapii alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml; roztwór do nakrapiania.

UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi przepisami, produkt jest dostępny do sprzedaży tylko w przypadku odbioru osobistego lub zlecenia odbioru w wybranej firmie kurierskiej.

Bayer Advantix Krople Na Kleszcze I Pchły 4x6ml - Dane Techniczne

- Pojemność: 4x6ml
- Skład: imidaklopid, permetryna

Bayer Advantix Krople Na Kleszcze I Pchły 4x6ml - Sposób Użycia

- Wyjmij pipetę z opakowania
- Trzymając pipetę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę
- Odwróć końcówkę i umieć drugim końcem na pipiecie. Przekręć końcówkę, aby przebić zamknięcie, po czym zdejmij końcówkę z pipety
- Zawartość pipety należy zakropić na skórę psa od łopatek do nasady ogona
- Zalecana minimalna dawka wynosi 10 mg/kg masy ciała imidaklopidu i 50 mg/kg masy ciała permetryny
- Wyłącznie do stosowania na skórę

Dodatkowe Informacje

Aby utrudnić pchłom bytowanie w środowisku, zaleca się stosowanie środków zwalczających dorosłe pchły i osobniki w stadiach rozwojowych w otoczeniu zwierzęcia.

Jednorazowe leczenie zapewnia widoczne działanie odstraszające wobec meszek i komarów w ciągu czterech tygodni,

zmniejszając przez to ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych.

Preparat zachowuje skuteczność po zmoczeniu sierści zwierzęcia.

Jednakże w przypadku częstego kontaktu z wodą, konieczne może być ponowne naniesienie preparatu, w zależności od obecności ectopasożytów w otoczeniu zwierzęcia.

W takim przypadku nie należy stosować preparatu częściej, niż raz na tydzień.

W przypadku zaistnienia konieczności umycia psa szamponem, zaleca się uczynić to przed naniesieniem preparatu lub przynajmniej w tydzień po jego zastosowaniu, w celu uniknięcia konieczności powtarzania zabiegu.

Działania niepożądane:

W rzadkich przypadkach może wystąpić u psów przejściowa nadwrażliwość skóry (łącznie z objawami świądu i rumieniem w miejscu podania) i osowiałość.

Ostrzeżenia specjalne:

Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu zawartości pipety z oczami lub pyskiem psa, u którego stosuje się preparat. Należy dopilnować, aby produkt został podany we właściwy sposób, zgodnie z opisem w części (dawkowanie).