

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/bayer-dronspot-krople-na-robaki-i-pasozyty-2x1-12ml-p-147076.html>



## Bayer Dronspot Krople Na Robaki I Pasożyty 2x1,12ml

Cena	<b>102,12 zł</b>
Numer katalogowy	<b>5909991409067</b>
Kod producenta	<b>5909991409067</b>
Faza życia	<b>Wszystkie fazy życia</b>
Zastosowanie	<b>Owadobójcze</b>
Pojemność	<b>2, 24</b>

### Opis produktu

#### Bayer Dronspot Krople Na Robaki I Pasożyty 2x1,12ml - Opis Produktu

Bayer Dronspot to wygodne do podania krople na pasożyty wewnętrzne dla kotów powyżej 8 tygodnia życia (o wadze od 5kg do 8kg).

Dronspot to pierwszy na rynku produkt OTC do zwalczania inwazji nicieni i tasiemców z przewodu pokarmowego kota, w formie kropli do podania na skórę. Wygodna i bezpieczna forma aplikacji idealnie sprawdzi się u kotów, które nie dają sobie podać tabletki.

#### Bayer Dronspot Krople Na Robaki I Pasożyty 2x1,12ml - Dane Techniczne

- Pojemność: 2x1,12ml
- Skład: Prazykwantel 96 mg, Emodepsyd 24 mg, Butylohydroksyanizol (E320) 6,05 mg

#### Bayer Dronspot Krople Na Robaki I Pasożyty 2x1,12ml - Sposób Użycia

- Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zważyć kota, aby dobrać dla niego właściwą wielkość pipety
- Oddziel jedną pipetkę od opakowania. Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówka do góry, przekręć i zdejmij końcówkę, po czym użyj drugiej strony końcówki, aby zerwać zamknięcie
- Rozsuń kotu sierść na szyi, u podstawy czaszki tak, aby widoczna była odsłonięta skóra
- Przytknij koniec pipetki do skóry i mocno ściśnij kilkakrotnie pipetkę w celu wyciśnięcia jej zawartości bezpośrednio na skórę
- Nie głaszcz kota w miejscu podania preparatu, do czasu wchłonięcia

#### Dodatkowe Informacje

Stosować 4 razy w roku.

##### Przeciwwskazania:

Nie stosować u kociąt poniżej 8 tygodnia życia lub ważących poniżej 0,5 kg.

Nie stosować w przypadkach znanej nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

##### Podawanie:

Przed zastosowaniem produktu należy zważyć kota, aby mieć pewność by dobrać odpowiednią wielkość pipety. Krople należy zaaplikować na skórę kota na wysokości karku, rozchylając jego sierść. Jedna pipeta wystarcza na jedną aplikację. Po wylaniu preparatu na skórę, należy poczekać aż krople całkowicie się wchłoną.

W celu eliminacji oraz ograniczenia ryzyka ponownej inwazji nicieni i tasiemców, zalecane jest rutynowe stosowanie co 3 miesiące.