

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/beaphar-lactol-puppy-milk-preparat-mlekozastepczy-dla-szczeniat-1kg-p-109172.html>



## Beaphar Lactol Puppy Milk - preparat mlekozastępczy dla szceniąt 1kg

Cena	<b>118,61 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>mls-16797</b>
Kod EAN	<b>8711231151882</b>

### Opis produktu

#### Beaphar Lactol Puppy Milk - mleko w proszku dla szceniąt

Pokarm mlekozastępczy dla szceniąt.

Pożywienie stanowiące idealny pokarm mlekozastępczy i uzupełniający, zastępujący mleko matki dla szceniąt przy dużym miocie, od pierwszych dni życia.

Puppy Milk może być stosowane jako kompletny pokarm dla osieroconych szceniąt od momentu urodzenia do 35 dnia życia.

Produkt może być również dodatkiem do pożywienia jako uzupełnienie diety suk w czasie ciąży oraz podczas laktacji, jak również dla starszych zwierząt po chorobie lub w czasie rekonwalescencji.

Normalne mleko nie dostarcza niezbędnych proporcji białka i tłuszczu. Lactol Puppy Milk dostarcza optymalnie zbilansowane ilości tłuszczu i wszystkie niezbędne witaminy i minerały.

Preparat został wzbogacony o DHA (NKT Omega 3 naturalnie obecny w mleku suk).

#### Skład:

Mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze, minerały.

#### Analiza:

Białko surowe 24 %, oleje i tłuszcze surowe 24 %, włókno surowe 0%, popiół surowy 7 %, wilgotność 3,5 %, wapń (Ca) 0,8 %, sód (Na) 0,5 %, fosfor (P) 0,7 %, magnez (Mg) 0,16%, potas (K) 1,5%, DHA 0,1%

#### Dodatki dietetyczne (zawartość w kg)

witamina A 25 000 IU.; witamina D3 2000 j.m.; witamina C 100 mg; witamina E 130 mg; witamina B1 5 mg; witamina B2 3 mg; D-pantotenian wapnia 10 mg; witamina B6 3 mg; witamina B12 60 µg; biotyna 50,0 µg; witamina K3 2,9 mg; żelazo (Fe) 80 mg; cynk (Zn) 50 mg; mangan (Mn) 30 mg; jod (I) 0,25 mg; selen (Se) 0,2 mg; DL-metionina 3000 mg. Przeciwtleniacze.

#### Zastosowanie Lactolu:

- Karma dla osieroconych szceniąt i szceniąt pochodzących z licznych miotów
- Jako uzupełnienie diety dla szceniąt po odsadzeniu
- Jako uzupełnienie diety suk ciężarnych i w okresie laktacji oraz dla zwierząt chorych.

#### Sposób stosowania:

---

Dodaj Lactol do ciepłej (nie gorącej) wody i mieszaj do całkowitego rozpuszczenia. Pozwól aby ostygło, osiągając temp. około 38 stopni C. (temperatura ciała). Starsze zwierzęta często wolą pić zimny Lactol. Zaleca się stosowanie akcesoriów, takich jak Beaphar Feeding Set lub Beaphar Syringes, które należy utrzymywać w nienaganej czystości i sterylizować, szczególnie w przypadku najmłodszych zwierząt.

Przyrządzony Lactol może być przechowywany w lodówce do 24 godzin, ale przed podaniem powinien być ponownie ogrzany do temperatury ciała, gdy jest stosowany u młodych zwierząt.

Należy zapewnić dostęp do świeżej wody pitnej.

**Rekomendowane proporcje:** dodawać 7 łyżeczek miarowych (miuszczących po 4,5g) na każde 100 ml ciepłej wody.