

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/franCodex-pasta-odklaczajaca-70g-fr179124-p-39050.html>



Francodex Pasta odkłaczająca 70g [FR179124]

Cena	24,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	mls-13247
Kod EAN	3283021791240

Opis produktu

Środek przeciw zakłaceniom

Karma uzupełniająca dla kotów i kociąt powyżej 6. miesiąca życia. Ułatwia walkę z zakłaceniami.

SKŁAD:

zboża (ekstrakt słodowy 48%), oleje i tłuszcze, produkty uboczne pochodzenia roślinnego

DODATKI (na kg):

emulgatory, konserwanty, witamina E 10 mg, substancje aromatyzujące i barwiące

ANALIZA SKŁADU:

białko surowe 1,2%, włókno surowe 10,8%, tłuszcz surowy 40%, popiół 0,7%, wilgotność 11,5%

Właściwości:

Pomaga zapobiegać powstawaniu zakłaceń w przewodzie pokarmowym kotów i sprzyja ich usuwaniu.

Kiedy koty liżą sierść, połykają włosy, które gromadzą się w żołądku i przewodzie pokarmowym. Powstające w ten sposób zakłaczenia mogą wywoływać wymioty, zaparcia, wzdęcia lub kaszel. Aby zapewnić Twojemu kotu dobre samopoczucie, należy pomóc mu w walce z zakłaceniami. Regularne szczotkowanie zwierzęcia pozwala ograniczyć ten problem. Proponowany produkt nawilża przewód pokarmowy i pomaga w walce z zakłaceniami.

Regularnie stosowany zapobiega również powstawaniu nowych kulek sierści.

Wysokie walory smakowe: dzięki odpowiednio dobranej kompozycji składników produkt wyróżniają wysokie walory smakowe.

SPOSÓB UŻYCIA:

Umieść niewielką ilość produktu na końcówce tubki lub na przednich łapach, tak aby kot z łatwością zlizął pastę. Możesz również włożyć niewielką ilość produktu do miseczki zwierzęcia.

ABY ZAPOBIEC POWSTAWANIU ZAKŁACZEŃ

ABY WSPOMÓC USUWANIE ZAKŁACZEŃ

Kocięta powyżej 6. miesiąca życia

Podawać 5 mm produktu tygodniowo (jednorazowo lub etapami).

Podawać 15 mm produktu dziennie przez trzy kolejne dni.

Koty dorosłe

Podawać 5-15 mm produktu (jednorazowo lub etapami).

Podawać 25 mm produktu dziennie, przez trzy kolejne dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt przeznaczony wyłącznie dla kotów. Dokładnie przestrzegać sposobu użycia i zalecanych ilości. Jeśli objawy zakłócenia utrzymują się, należy zasięgnąć porady weterynarza.

Nie podawać kociętom poniżej 6. miesiąca życia. Chronić przed dziećmi i zwierzętami. W razie przypadkowego połknięcia przez dziecko, zasięgnąć porady lekarza.