



Vet-Agro Anigran 50g

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Cena | 258,05 zł |
| Numer katalogowy | 8595163717404 |
| Kod producenta | 8595163717404 |
| Specjalna potrzeba(filtry) | Dezynfekcja, Rany |
| Waga | 50 |
| Specjalna potrzeba | Dezynfekcja, Gojenie ran |

Opis produktu

Vet-Agro Anigran 50g - Opis Produktu

Szybko leczy rany, otarcia i zakażenia u wszystkich zwierząt.

Nawilża rany tym samym tworzy sprzyjające warunki do leczenia, a jednocześnie zapobiega przywieraniu opatrunku do rany.

Jest on używany do pokrywania, czyszczenia, nawilżania zarówno głębokich jak i powierzchniowych ran i uszkodzeń skóry, siniaków, oparzeń, pogarszających się ran po operacji, trudno lub powolnie gojących się ran, rozległych otarć, zakażonych ran i ukąszeń.

Kwas hialuronowy jest naturalnym polisacharydem, częścią tkanek skóry, gdzie odgrywa integralną rolę w macierzy pozakomórkowej. W procesie gojenia rany utrzymuje środowisko rany naturalnie nawilżone, wspierając żywotność oraz migrację komórek. Przyciąga wodę i czynniki odżywcze na ranę z okolicznych tkanek, powoduje ich koncentrację w okolicy rany co ma pozytywny wpływ na proces gojenia się rany.

Vet-Agro Anigran 50g - Dane Techniczne

- Opakowanie: 50g
- Skład: Sódium hyaluronate (1.5 g/100 ml), Potassium iodide (0.15 g/100 ml), Iodine (0.1 g/100 ml), Woda do iniekcji (Hialuronian sodu jest stabilizowany przez związki jodu)

Vet-Agro Anigran 50g - Sposób Użycia

- Rana 5x5 cm: 2ml
- Rana 7,5x7,5cm: 5ml
- Rana 10x10cm: 7-8ml
- Przed zastosowaniem oczyścić ranę, usunąć zanieczyszczenia i futro wokół
- W niewielkich ranach: bezpośrednio na ranę (najlepiej za pomocą jałowej strzykawki)
- W przypadku dużych ran: stosuje się na gazę lub sterylny opatrunek
- Odpowiednią ilość żelu nanieść na gazę, palcami rozprowadzać do pełnego nasycenia żelem
- Nasyconą gazę przyłożyć do rany
- Po przyłożeniu żelu do rany przykryć kolejnym absorpcyjnym opatrunkiem (np. sterylną gazą), w zależności od wysięku z rany
- Częstość zmieniania opatrunku: czyste/niezainfekowane rany: 2-3 dni
- Zainfekowane rany: 1 dzień

Dodatkowe Informacje

Ostrzeżenia:

Tylko do użytku zewnętrznego.

Nie używać po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

Nie używać, jeśli produkt zmienia kolor lub staje się bezbarwny.

Do użytku weterynaryjnego.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze do 25 C.
Po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu (2-8 C).
Chronić przed zamrażaniem i bezpośrednimi promieniami słonecznymi.