

Link do produktu: <https://www.skleplazwierzat.net/vet-agro-fiprex-duo-kot-fretka-0-5ml-p-148466.html>



Vet-Agro Fiprex Duo Kot, Fretka 0,5ml

Cena	17,19 zł
Numer katalogowy	5909991428525
Kod producenta	5909991428525
Pojemność	0, 5
Faza życia	Wszystkie fazy życia
Zastosowanie	Owadobójcze

Opis produktu

Vet-Agro Fiprex Duo Kot, Fretka 0,5ml - Opis Produktu

FIPREX DUO to roztwór do nakrapiania dla kotów i frotek. Dla kotów w wieku powyżej 8 tygodni i (lub) ważących więcej niż 1 kg. Nie należy stosować produktu u frotek w wieku poniżej 6 miesięcy.

Koty:

Zwalczanie inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami i (lub) wszołami.
Zwalczanie pcheł. Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 4 tygodnie.
Zwalczanie jaj, larw i poczwerek pcheł. Działanie to utrzymuje się przez okres 6 tygodni po zabiegu.
Zwalczanie kleszczy. Działanie roztoczobójcze produktu utrzymuje się do 2 tygodni po podaniu.
Zwalczanie wszołów.

Fretki:

Zwalczanie inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami i (lub) wszołami.
Zwalczanie pcheł. Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 4 tygodnie.
Zwalczanie jaj, larw i poczwerek pcheł.
Zwalczanie kleszczy. Działanie roztoczobójcze produktu utrzymuje się przez 4 tygodnie po podaniu.

Produkt może być wykorzystywany w ramach usuwania objawów klinicznych alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS), o ile zostało ono wcześniej rozpoznane przez lekarza weterynarii.

Vet-Agro Fiprex Duo Kot, Fretka 0,5ml - Dane Techniczne

- Pojemność: 0,5 ml
- Skład: Fipronil 50,00 mg, (S)-metopren 60,00 mg

Vet-Agro Fiprex Duo Kot, Fretka 0,5ml - Sposób Użycia

- Trzymaj pipetę pionowo
- Stuknij wąską część pipety, aby upewnić się, że zawartość pozostaje w głównym korpusie pipety
- Odstaw końcówkę
- Rozsuń sierść na grzbiecie zwierzęcia u podstawy szyi przed łopatkami, aż skóra będzie widoczna
- Umieść końcówkę pipety na skórze i ściśnij pipetę kilka razy, aby całkowicie opróżnić jej zawartość bezpośrednio na skórze w jednym miejscu
- Nie należy kąpać zwierzęcia 2 dni po podaniu produktu i częściej niż raz w tygodniu
- Okres pomiędzy kolejnymi zabiegami wynosi 4 tygodnie

Dodatkowe Informacje

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u kociąt poniżej 8 tygodnia życia i/lub ważących mniej niż 1 kg.
Nie stosować w przypadkach znanej nadwrażliwości na substancję czynną lub dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe.
Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji.
Nie stosować u królików, u których produkt może wywoływać ciężkie działania niepożądane, a nawet prowadzić do śmierci.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Koty: Bardzo rzadko obserwowano przejściowe reakcje skórne w miejscu podania (łuski, miejscowa utrata sierści, świąd, zaczerwienienie skóry) oraz uogólniony świąd i wyłysienia.

Czasami obserwowano nadmierne ślinienie się, odwracalne objawy neurologiczne (przećulica, depresja, objawy nerwowe) lub wymioty.

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą: bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane); często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt); niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt); rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt); bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

Jeżeli dojdzie do wylizania produktu może pojawić się krótkotrwałe ślinienie wywołane działaniem nośnika.

Należy unikać przedawkowania.