

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/vet-agro-fiprex-spray-100ml-p-150713.html>



Vet-Agro Fiprex Spray 100ml

Cena	41,83 zł
Numer katalogowy	5909997066639
Kod producenta	5909997066639
Wielkość pupila	Bez ograniczeń producenta
Zastosowanie	Owadobójcze
Pojemność	100
Specjalna potrzeba	Alergia skórna
Faza życia	Wszystkie fazy życia
Specjalna potrzeba(filtry)	Skóra

Opis produktu

Vet-Agro Fiprex Spray 100ml - Opis Produktu

Fiprex Spray roztwór na skórę dla psów i kotów powyżej 8 tygodnia życia, przeciwko inwazji pcheł, kleszczy i wszy.

Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy przez okres 4 tygodni.

Fiprex można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

Vet-Agro Fiprex Spray 100ml - Dane Techniczne

- Pojemność: 100ml
- Skład: Fipronil 0,5 g/100 ml

Vet-Agro Fiprex Spray 100ml - Sposób Użycia

- Preparat podawać zewnętrznie, bezpośrednio na skórę
- Nie kąpać zwierząt 2 dni przed i 2 dni po zastosowaniu produktu
- Preparat stosuje się zewnętrznie na skórę w dawce: od 1,5 do 3,0 ml na 1 kg m.c. – tj. 7,5 – 15 mg fipronilu/kg m.c., co odpowiada 3-6 naciśnięć pompki dozownika butelki na 1 kg m.c
- Zdjąć osłonkę spryskiwacza
- Preparat rozpylać równomiernie z odległości około 20 cm, odgarniając sierść, bezpośrednio na całą powierzchnię skóry zwierzęcia
- Unikać przedostania się preparatu do oczu i nosa (w tym celu na okolice głowy u zwierząt nerwowych lub szczeniąt można nanieść produkt za pomocą zwilżonej gąbki)
- Po zabiegu ponownie zabezpieczyć spryskiwacz osłonką
- Producent nie ogranicza wagi zwierzęcia

Dodatkowe Informacje

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u szczeniąt i kociąt poniżej 8 tygodnia życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe.

Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji.

Nie stosować u królików.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W przypadku polizania przez zwierzę miejsca zastosowania preparatu, może wystąpić ślinotok, wymioty oraz inne objawy ze strony układu nerwowego (nadwrażliwość, osowiałość).

Działania niepożądane ustępują zwykle po 24 godzinach.
W miejscu podania może wystąpić tymczasowe odbarwienie futra, miejscowe wyłysienie, zaczerwienienie, świąd lub przetłuszczony wygląd.