

Vetoquinol Zylkene 225mg 10tab



Cena	51,61 zł
Numer katalogowy	138551385513855
Kod producenta	138551385513855
Specjalna potrzeba(filtry)	Stres
Specjalna potrzeba	Kontrola stresu
Ilość	10
Faza życia	Bez ograniczeń producenta
Wielkość pupila	Rasy średnie, Rasy duże

Opis produktu

Vetoquinol Zylkene 225mg 10tab - Opis Produktu

Zylkene Pierwsza pomoc w stresujących sytuacjach dla psów i kotów o wadze od 10 do 30 kg.

Zylkene zawiera alfa-kazozepinę – naturalny biologicznie aktywny peptyd otrzymywany z mleka. Alfa-kazozepina jest znana z wywoływania stanu relaksacji u noworodków karmionych mlekiem matki.

Zylkene zaleca się stosować u psów i kotów reagujących nadmierną bojaźliwością bądź niepokojem.

Skład

- Kazeina (kazeina bydlęca hydrolizowana trypsyną)
- Maltodekstryna
- Stearynian magnezu

Analiza Składu

- Białko surowe 73,8%
- Popiół surowy 10,7%
- Wilgotność 6,6%
- Oleje i tłuszcze surowe 0,4%
- Włókna surowe 1%

Dodatki Na 1kg

- Producent nie podaje dodatków

Dawkowanie

10 - 15 kg	1 tab./dzień
15 - 30 kg	2 tab./dzień

Producent nie ogranicza wieku zwierzęcia.

Dodatkowe Informacje

Jest z powodzeniem stosowany w sytuacjach związanych z utratą stabilizacji środowiska i zmianami rytmu dnia codziennego zwierząt takich jak:

Pojawienie się nowego zwierzęcia w domostwie.
Pojawienie się nowych domowników.

Przeprowadzki, przemeblowanie, wystawy.
Wizyty w lecznicach weterynaryjnych.
Jazda samochodem.
Wyjazdy właścicieli.
Burze, wybuchy fajerwerków.

Kapsułki Zylkene zawierają apetyczny dla psów i kotów proszek o mlecznym smaku. Kapsułkę można podawać w całości lub otworzyć i jej zawartość wymieszać z karmą, smakołykiem lub płynem. Podawać należy raz dziennie. Należy zapewnić ciągły dostęp do wody.

Czas podawania preparatu zależy od indywidualnej wrażliwości zwierzęcia – intensywności reakcji strachu. W nasilonych przypadkach jak np. nadwrażliwości na dźwięki, w problemach separacyjnych skojarzone stosowanie Zylkene z terapią behawioralną może być niezbędne lub nawet wymagać psychofarmakologii.

Krótkotrwałe: rozpocząć 1-2 dni przed przewidywanym zdarzeniem, niektóre zwierzęta mogą wymagać wcześniejszego podawania (5-7 dni).

Długotrwałe: początkowo przez okres 1-2 miesięcy, przed wydłużeniem stosowania zaleca się ocenę działania Zylkene.