

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/virbac-diaproof-pro-100g-p-154536.html>



Virbac Diaproof Pro 100g

Cena	17,25 zł
Numer katalogowy	5902020185444
Kod producenta	5902020185444

Opis produktu

Mieszanka paszowa uzupełniająca, pasza dietetyczna.

W zaburzeniach równowagi wodno-elektrolitowej.

Gatunki zwierząt: bydło, kozy, konie

Wskazania:

Utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej.

Skład:

Monohydrat dekstrozy 38,4%; babka jajowata 27%; drożdże suszone piwne.

Dwuwęglan sodu 7,08%; chlorek sodu 4,85%; chlorek potasu 3,3%; mąka pszenna; wodorotlenek magnezu 1,07%

DODATKI DIETETYCZNE (w 1 kg)

Aminokwasy

L-glutamina 2 g

Witaminy

Witamina PP (nikotynamid) 8,7 g

Witamina E (octan alfa tokoferolu) 2,205 g

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Białko surowe 7,7%

Włókno surowe 1,5%

Tłuszcz surowy 1,0%

Popiół surowy 18,1%

Cukier całkowity 38,4%

Sód 4,7%

Magnez 0,4%

Potas 1,7%

Chlor 4,9%

Stosowanie:

W przypadku zagrożenia, w trakcie lub po przebytych zaburzeniach trawiennych (biegunka). Przed zastosowaniem produktu skonsultuj się z lekarzem weterynarii. Zalecany czas podawania: od 1 do 6 dni (od 1 do 3 dni, gdy zwierzę otrzymuje tylko Diaproof Pro). Wymieszaj i podaj produkt szybko, zanim zamieni się w żel. Czas przygotowania i karmienia nie może przekroczyć 20 minut. Diaproof Pro nie powinien być podawany razem z produktami o działaniu rozkurczowym i/lub z innymi elektrolitami.

Cielęta i źrebięta:

Cielęta (lub źrebięta) powinny mieć dostęp do świeżej i czystej wody pomiędzy posiłkami (dzienna, całkowita ilość płynu: 8-10 litrów). W przypadku małych ras objętość napoju można zmniejszyć do 1,5 litra, a dawkę Diaproof Pro do 75 g.

3 posiłki co 12 godzin	Woda lub mleko o temp. 40°C	Diaproof Pro (saszetka 100 g)
Dzień pierwszy	Pierwsze podanie	2 litry
Po 12 godzinach	2 litry	1 saszetka
Dzień drugi	Po kolejnych 12 godzinach	2 litry

Przygotowanie: 1 saszetkę 100 g rozpuścić w 2 litrach ciepłej wody lub mleka (40°C).

Podawanie: Wymieszaj i podaj produkt szybko, zanim zamieni się w żel.

Ostrzeżenie: Czas przygotowania i karmienia nie może przekroczyć 20 minut.

Stosowanie: 3 posiłki po 2 litry co 12 godzin, następnie stopniowy powrót do diety mlecznej, pół mleka/pół wody.

Jagnięta i kozłeta:

Przygotuj roztwór jak przedstawiono poniżej w tabeli, podawaj od 200 do 500 ml tego roztworu, 3 krotnie co 12 godzin.

3 posiłki co 12 godzin	Diaproof Pro (saszetka 100 g)
Dzień pierwszy	1. Podanie
Po 12 godzinach	½ litra wody lub mleka o temp. 40°C
Dzień drugi	Po kolejnych 12 godzinach