

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/virbac-effipro-spot-on-dla-kotow-4x0-5ml-p-144018.html>

## Virbac Effipro Spot-On Dla Kotów 4x0,5ml

Cena	<b>44,23 zł</b>
Numer katalogowy	<b>3597133088298</b>
Kod producenta	<b>3597133088298</b>
Ilość	<b>4</b>
Zastosowanie	<b>Owadobójcze</b>
Pojemność	<b>0, 5</b>
Faza życia	<b>Wszystkie fazy życia</b>

### Opis produktu

#### Virbac Effipro Spot-On Dla Kotów 4x0,5ml - Opis Produktu

Roztwór do stosowania na skórę dla kotów powyżej 2 miesiąca życia i powyżej 1kg masy ciała. Produkt zapewnia skuteczną ochronę przed pchłami (*Ctenocephalides felis*) przez okres do 5 tygodni. Produkt zapewnia skuteczne działanie roztoczbójcze przez okres do 2 tygodni - w przypadku kleszczy (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*). W przypadku obecności kleszczy pewnych gatunków (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*) podczas stosowania produktu, nie wszystkie kleszcze mogą być zabite w ciągu pierwszych 48 godz., ale mogą być zabite w ciągu tygodnia. Produkt może być stosowany jako element strategii zwalczania APZS (Alergicznego pchlego zapalenia skóry), wcześniej zdiagnozowanego przez lekarza weterynarii.

#### Virbac Effipro Spot-On Dla Kotów 4x0,5ml - Dane Techniczne

- Skład: 1 pipetka (0,5 ml) zawiera: Substancja czynna: Fipronil 50 mg Substancje pomocnicze: Butylhydroksyanizol E 320 0,1 mg Butylhydroksytoluen E 321 0,05 mg
- Pojemność: 4x0,5ml

#### Virbac Effipro Spot-On Dla Kotów 4x0,5ml - Sposób Użycia

- Tylko do użytku zewnętrznego
- Podawać punktowo na skórę 1 pipetkę (0,5 ml) na zwierzę
- Trzymać pipetkę czubkiem do góry
- Uderzyć w wąską część pipetki tak, by mieć pewność, że cała zawartość znajduje się w jej głównej części
- Ułamać czubek pipetki wzdłuż wyznaczonej linii
- Odgarnąć sierść tak, by była widoczna skóra
- Umieścić końcówkę pipetki na odkrytej skórze i delikatnie nacisnąć ją kilka razy do czasu całkowitego opróżnienia
- Powtórzyć tę czynność w 1 lub 2 różnych miejscach wzdłuż grzbietu kota, preferując nasadę głowy i okolice między łopatkami
- Ważnym jest by mieć pewność, że zwierzę nie będzie mogło polizać miejsca, gdzie zastosowano produkt oraz by mieć pewność, że zwierzęta nie będą mogły lizać się między sobą po jego zastosowaniu
- Należy unikać nadmiernego zmoczenia produktem sierści, ponieważ może to powodować sklepanie się sierści w miejscu podania produktu
- Jednakże, jeśli tak się stanie, po 24 godzinach od zastosowania powinno to zniknąć
- Białe osady mogą być widoczne w miejscu podania produktu do 48 godzin po jego zastosowaniu

#### Dodatkowe Informacje

Dla skutecznego zwalczania inwazji pcheł i/lub kleszczy schemat stosowania powinien uwzględniać miejscową sytuację epidemiologiczną.

Z powodu braku odpowiednich badań bezpieczeństwa, minimalny okres między kolejnym zastosowaniem produktu powinien wynosić 4 tygodnie.

---

**Przeciwwskazania:**

Nie stosować u kociąt w wieku poniżej 2 miesięcy i/lub ważących mniej niż 1 kg w przypadku braku danych.

Nie stosować u zwierząt chorych (np. choroby układowe, gorączka) lub ozdowieńców.

Nie stosować u królików, ponieważ mogą pojawić się działania niepożądane, nawet śmierć.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na inne składniki produktu.

W przypadku lizania się zwierzęcia, może dojść do wystąpienia krótkotrwałego nadmiernego ślinienia, zależnego głównie od składnika produktu.

Spośród wyjątkowo rzadko występujących działań niepożądanych mogą wystąpić w miejscu podania przemijające reakcje skórne (łuszczenie naskórka, miejscowe wyłysienia, świąd, zaczerwienienie) i ogólny świąd lub wyłysienia.

Wyjątkowo mogą pojawić się: nadmierne ślinienie, odwracalne objawy neurologiczne (przeuczulica, depresja, objawy nerwowe), wymioty.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w suchym miejscu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie używać po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu tekturowym i pipetce.

Nie wyjmować z blistra do czasu zastosowania produktu.